



# Oral Care Water

高濃度電解次亜塩素酸水


pH 9 500ppm

高濃度電解次亜塩素酸水は、純度 99.9%の塩と不純物を限界まで取り除いた「超純水」を電気分解させた電解水です。

口腔内の雑菌などを消毒・破壊して口臭の発生を防ぎ、プラークの形成を制御することにより、歯周病や虫歯を予防します。

市販されている洗口剤とは全く違い、アルコール・着色料・保存料などは一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。

口腔内の洗口以外にも様々な分野で安全安心な殺菌・消毒として使用されています。



## このような効果があります。

- お口の中がネバネバするなど不快感の解消
- 口臭の予防
- 歯周病（歯ぐきが腫れる・出血する）の予防
- 虫歯の予防
- インフルエンザの予防

## ご使用方法

キャップの1メモリ（10cc）を口に含み、30秒ほどゆすいだ後、通常の歯磨きを行って下さい。朝起きた後や夜寝る前などにご使用下さい。

お試しになりたい方、ご使用になりたい方は、お気軽にスタッフまでお申し付け下さい。



医療法人社団 藤弘会



日暮里駅前デンタルクリニック

西日暮里駅前デンタルクリニック



## ホームケアの方法

### 原液でのご使用方法



キャップの1メモリ（10cc）の原液を口に含み、  
「クチュクチュ」とお口全体に行き渡るようにゆすぐ。



30秒ぐらいを目安に！

口に含んだまま歯ブラシ・歯間ブラシなどで歯と歯ぐきの間に入れ込むようにして磨く。

### 希釈するご使用方法



①コップ半分の水 または お湯 を用意し、キャップの1メモリ（10cc）の原液を加える。  
②口に含み「クチュクチュ」とお口全体に行き渡るようにゆすぐ。



30秒ぐらいを目安に！

口に含んだまま歯ブラシ・歯間ブラシなどで歯と歯ぐきの間に入れ込むようにして磨く。

### 塩素系（フール）の臭いや味がする？

お口のバイ菌が多いほど塩素系の臭いが強くします。体には全く害はありません。  
気持ち悪いときは、水でゆすいで下さい。  
お口の中のバイ菌が少なくなると塩素の味も少なくなります。

朝・昼・晩に「ゆすぎ磨き」をすると効果的！

忙しいければ、夜寝る前だけでもご使用下さい。朝起きた時の「ネバネバ感」を軽減します。

使い終わった後は、キャップをきちんと閉めて常温で保管して下さい。（日の当たる場所はお避け下さい。）

ご不明な点などがございましたら何なりとご質問ください。

医療法人社団 藤弘会



日暮里駅前デンタルクリニック  
西日暮里駅前デンタルクリニック

## □ 次亜塩素酸水のその他の使用方法

スプレーボトル等の容器に入れ希釈し、直接噴きかけるなどしてお使い下さい。ご不明な点は、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい。

医療法人社団 藤弘会

日暮里駅前デンタルクリニック  
西日暮里駅前デンタルクリニック

### 250ppm 主な用途

5:5

希釈水（水道水⇄精製水） 1/2

次亜塩素酸水（濃度 500ppm） 1/2

生ゴミの消毒

お部屋のカビ対策

蛇口の除菌

ペットの消毒

入れ歯の除菌

歯垢取り

### 100ppm 主な用途

2:8

希釈水（水道水⇄精製水） 4/5

次亜塩素酸水（濃度 500ppm） 1/5

お部屋の除菌・消毒

手すり・トアノブの除菌

厄ばこの除菌

車いすの除菌

おもちゃの除菌

ワイルス対策

靴などの除菌・消毒

「新型インフルエンザ」  
「ノロウイルス」等

### 50ppm 主な用途

1:9

希釈水（水道水⇄精製水） 9/10

次亜塩素酸水（濃度 500ppm） 1/10

まな板などの除菌

手指消毒

トイレの除菌

歯ブラシの除菌

洗面所の除菌・消毒

マスクの除菌

洗濯物の除菌・消毒

口腔内洗浄

# ORAL CARE

# WATER

高濃度電解次亜塩素酸水

医療法人社団 藤弘会

**殺菌・消臭**



日暮里駅前デンタルクリニック

NIIPPORI STATION  
DENTAL CLINIC

西日暮里駅前デンタルクリニック

品名：Oral Care Water  
濃度：500ppm (HCL020ppm OCL<sup>-</sup> 480ppm)  
原材料：精製水・塩化ナトリウム  
内容量：500ml  
使用期限：3ヶ月  
製造年月日：

<ご使用上の注意>

- ・他のアルカリ性製品と混ぜないで下さい。
- ・用途外には使用しないで下さい。
- ・コンタクトレンズへのご使用はお避け下さい。
- ・目に入った場合は、すぐに水で洗い流して下さい。
- ・ご使用后、皮膚等に異常が見られた場合は、使用を中止し、医師に相談して下さい。